

ES-00742	HERBOLEX	ADAMA ESPAÑA	ADAMA	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Vigente	Controla malas hierbas en postemergencia. En cultivos leñoso, en aplicaciones en la línea o entre líneas, la superficie tratada será del 50%, por lo que la dosis real de aplicación por ha será del 50%, quedando limitada a un máximo de 1,8 kg de s.a./ha (5 l p.f./ha) Adoptar prácticas alternativas de control de malas hierbas(mecánicas, culturales, etc.) cuando sea posible, y alternancia de herbicidas (con herbicidas de diferente modo de acción) para evitar el desarrollo de resistencias. En terrenos forestales no realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 kg s.a./ha (5 l p.f./ha) si existen setas silvestres en la zona a tratar.	False	El operario deberá llevar ropa de protección tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos, de acuerdo a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009, o bien ropa de protección C1, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN 27065: 2017, calzado resistente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II) conforme a la norma UNE-EN 13832-2, así como guantes de protección química conforme a la norma UNE-EN 374-1:2016. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables. Durante la mezcla/carga, deberá llevar además ropa de protección parcial tipo delantal tipo PB 3 o PB 4 o parcial de nivel C3 según norma UNE EN 27065: 2017. El trabajador deberá llevar ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente o bien Ropa de protección C1, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN 27065: 2017. Medidas adicionales de mitigación del riesgo: •Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. •En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga. •Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo •No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. El aplicador debe utilizar guantes de protección química y ropa de protección tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos, de acuerdo a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009 y calzado resistente durante la mezcla/carga y aplicación. El trabajador deberá utilizar ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente para la reentrada. En las pulverizaciones en fila, la dosis real de aplicación por ha será del 50%, quedando limitada a un máximo de 1800 g de sa/ha).
ES-00744	HERBOLEX 360	ADAMA ESPAÑA	ADAMA	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Vigente	Controla malas hierbas en postemergencia. En cultivos leñosos, en aplicaciones en la línea o entre líneas, la superficie tratada será del 50%, por lo que la dosis real de aplicación por ha será del 50%, quedando limitada a un máximo de 1800 g de sa/ha. Adoptar prácticas alternativas de control de malezas (mecánicas, culturales, etc.) cuando sea posible, y alternancia de herbicidas (con herbicidas de diferente modo de acción) para evitar el desarrollo de resistencias.	False	Medidas adicionales de mitigación del riesgo: •Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. •En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga. •Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo •No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. •Las pulverizaciones hidráulicas con tractor se limitan a un máximo de 300 l/ha de volumen de caldo. •Las pulverizaciones manuales hidráulicas deberán usar un mínimo de 325 l/ha de volumen de caldo. •Las pulverizaciones manuales centrífugas se limitarán a un máximo de dosis de 3 l/ha y un mínimo de 25 l/ha de volumen de caldo.

25401	BOOM EFEKT	Albaugh (Eslovenia) Albaugh (Eslovenia)	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Vigente	Controla malas hierbas en postemergencia. Pulverizar diluido en agua a baja presión. Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos. En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 l/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 Kg. de s.a/Ha.en terrenos forestales (coníferas y frondosas) si existen setas silvestres en la zona tratada. En la etiqueta se darán las advertencias relativas a los riesgos de utilización del producto. No permitir la entrada de ganado a las parcelas tratadas hasta haber transcurrido 10 días desde la fecha de la aplicación.	False	El aplicador deberá utilizar guantes adecuados durante la mezcla/carga y aplicación, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas. Además en las aplicaciones manuales deberán utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impermeables. El retorno a la faena en las áreas o cultivos tratados no deberá realizarse durante las primeras 24 horas tras la aplicación del producto. En cualquier caso, se deberá usar ropa y guantes de protección adecuados al menos las 48 horas siguientes a la aplicación. SPO 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
25508	VERDYS SUPREME	Albaugh (Eslovenia) ALBAUGH EUROPE SA	GLIFOSATO 48% [SL] P/V	Vigente	Pulverización normal con mochila o con tractor a baja	False	Aplicador: Se deberá utilizar guantes de protección química durante la mezcla/carga y guantes de protección química, ropa de protección química tipo 3 o 4 (de acuerdo a norma UNE-EN- 4605:2005+A1:2009) y calzado adecuado durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo. Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas. Trabajador: No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. SPO 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

25507	PITON SUPREME	Albaugh (Eslovenia)	ALBAUGH EUROPE SA	GLIFOSATO 48% (SAL AMÓNICA) [SL] P/V	Vigente	Tratamiento herbicida, contra malas hierbas anuales, bianuales y perennes, en post-emergencia de las mismas en: Cítricos, frutales de pepita, nogal, avellano, castaño, pino piñonero, pistachero, pacano, nuez de pecan, vid, olivo, frutales de hueso, almendro, kiwi, patata, batata, boniato, zanahoria, raíz de apio, aguaturma, tupinambo o pataca, chirivía, perejil de raíz gruesa, rábano, nabo, regaliz, tomate, berenjena, espárrago, cebolla, ajo, chalote, judía forrajera, judía para grano, judía verde, haba para grano, haba verde, haba forrajera, guisante verde, guisante para grano, guisante proteaginoso/forrajero, garbanzo, lenteja, altramuz, soja, remolacha azucarera y remolacha roja, maíz y sorgo, alfalfa, praderas (naturales y de siembra), chopos y álamos, viveros de ornamentales (palmáceas, palmera datilera, ornamentales herbáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas y frondosas), viveros de forestales (coníferas y frondosas), eriales, áreas no cultivadas. NO aplicar el producto en jardinería exterior doméstica.	False	En cítricos, frutales de pepita, nogal, avellano, castaño, pino piñonero, pistachero, pacano, nuez de pecan, vid, olivo, frutales de hueso, almendro, kiwi, espárrago, cebolla, ajo y escarola, maíz y sorgo, remolacha azucarera y roja, eriales y áreas no cultivadas, mediante pulverización normal con tractor o pulverización manual, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química, y durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605:2005 + A1:2009) y calzado adecuado. En maíz y sorgo, patata, boniato, batata, tomate, berenjena, viveros de ornamentales (palmáceas, palmera datilera, ornamentales herbáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas y frondosas), viveros de forestales (coníferas y frondosas), chopos y álamos, mediante pulverización localizada entre filas (pulverizador atomizador de disco rotatorio), durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química, y durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605:2005 + A1:2009) y calzado adecuado. En patata, boniato, batata, tomate, berenjena, judía forrajera, judía para grano, judía verde, haba para grano, haba verde, haba forrajera, guisante verde, guisante para grano, guisante proteaginoso/forrajero, garbanzo, lenteja, altramuz, zanahoria, apio, rábano, aguaturma, tupinambo o pataca, chirivía, perejil de raíz, gruesa, nabo, regaliz, soja, alfalfa, praderas (naturales y de siembra), remolacha azucarera y roja, mediante equipo selectivo (Humectante, goteo), durante la mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes de protección química. Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas. El operador no manipulará la instalación del sistema de riego durante la aplicación. Se recomienda revisar la instalación del sistema de riego antes del comienzo de la aplicación del producto. Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento. En caso de tener que colocar, retirar o mover los tubos de riego en las 48 horas posteriores al El aplicador deberá utilizar guantes de protección química, ropa de protección tipo 6 contra salpicaduras de productos líquidos, de acuerdo a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009 y calzado resistente. El trabajador deberá utilizar ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente.
ES-00754	RUNRUD	ASCENZA	ASCENZA	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Vigente	Controla malas hierbas en postemergencia. No aplicar en superficies impermeables donde exista un alto riesgo de escorrentía. No aplicar durante lluvias fuertes. No aplicar en “Malezas acuáticas” (incluida Thypha latifolia). Cuando sea posible, adopte prácticas alternativas de control de malezas (mecánicas, culturales, etc.). Para evitar la acumulación de resistencias, alterne el uso de RUNRUD con herbicidas con diferentes modos de acción. No confíe en un modo de acción herbicida en el mismo campo durante años consecutivos.	False	Medidas adicionales de mitigación del riesgo: · Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. · En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga. · Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo. · No entrar en las áreas tratadas hasta que se haya secado la pulverización. El aplicador deberá utilizar guantes de protección química, ropa de protección tipo 6 contra salpicaduras de productos líquidos, de acuerdo a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009 y calzado resistente.
ES-00755	HERCAMPO 36	ASCENZA	ASCENZA (P)	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Vigente	Controla malas hierbas en post-emergencia. No aplicar en superficies impermeables donde exista un alto riesgo de escorrentía. No aplicar durante lluvias fuertes. No aplicar en “Malezas acuáticas” (incluida Thypha latifolia). Cuando sea posible, adopte prácticas alternativas de control de malezas (mecánicas, culturales, etc.). Para evitar la acumulación de resistencias, alternar el uso del producto con herbicidas con diferentes modos de acción. No confiar en un modo de acción herbicida en el mismo campo durante años consecutivos.	False	El trabajador deberá utilizar ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente. Medidas adicionales de mitigación del riesgo: - Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. - En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga. - Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo. - No entrar en las áreas tratadas hasta que se haya secado la pulverización.

						SEGURIDAD DEL APLICADOR
						El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química + ropa de protección tipo 6 o C1 + delantal PB3 o PB4 o C3 + calzado resistente a productos químicos; y en la aplicación: guantes de protección química + ropa de protección tipo 6 o C1 + calzado resistente a productos químicos.
						SEGURIDAD DEL TRABAJADOR
						El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: ropa de trabajo adecuada o C1.
						NORMATIVA:
						- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente. - Ropa de protección tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009. - Calzado resistente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II) conforme a la norma UNE-EN 13832-2:2020. - Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2). - Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4] según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.
ES-01334	GALLUP 360-K	BARCLAY CHEMICA BARCLAY LTD	GLIFOSATO 36% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	Vigente	Tratamiento herbicida al aire libre por pulverización foliar. En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.	SEGURIDAD DEL APLICADOR
						El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química + ropa de protección tipo 6 o C1 + delantal PB3 o PB4 o C3 + calzado resistente a productos químicos; y en la aplicación: guantes de protección química + ropa de protección tipo 6 o C1 + calzado resistente a productos químicos.
						SEGURIDAD DEL TRABAJADOR
						El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: ropa de trabajo adecuada o C1.
						NORMATIVA:
						- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente. - Ropa de protección tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009. - Calzado resistente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II) conforme a la norma UNE-EN 13832-2:2020. - Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2). - Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4] según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.
ES-01333	Krypt 540	BARCLAY CHEMICA BARCLAY LTD	GLIFOSATO 54% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	Vigente	Tratamiento herbicida al aire libre por pulverización foliar. En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.	

17410	ROUNDUP XXI	MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [UL] P/V	Vigente	Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar mediante equipos accionados por tractor en pulverización hidráulica (100-400 l/Ha. de caldo - dosis máxima 10 l/Ha.), centrifuga (20-50 l/Ha. - dosis máxima, 6 l/Ha.) o manuales con pulverización hidráulica 100 - 400 l/Ha. de caldo, dosis máx. 6 l/Ha., equipos para aplicación de producto puro, dosis máx. 6 l/Ha. Aplicadores manuales por contacto, dosis 2 l/Ha. Para jardinería exterior doméstica mochila a dosis de 1,25 cc/m2 Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos. En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 l/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 Kg. de s.a./Ha.en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada. Tratamiento herbicida al aire libre por pulverización foliar contra malas hierbas anuales (Malva sp., Urtica sp., Polygonum sp., Portulaca oleracea.)y malas hierbas perennes (Cynodon dactylon, Sorghum halepense, Pteridium aquilinum, Convolvulus arvensis, Cirsium arvense, Cyperus sp.) La dosis máxima de uso del producto se limita por temporada a 900 g s.a./ha (2,5 l/ha) para el control de malas hierbas antes de la siembra/plantación, después de la recolección y antes de la preparación del suelo para la siembra y los usos en pastizales y barbechos. La dosis máxima por temporada para el control de malas hierbas en viñedos y frutales es de 1800 g s.a./ha (5 l/ha)". En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta utilización del producto. Recomendaciones agronómicas a añadir en la etiqueta: •En los cultivos leñosos y en viñedo la pulverización de las malas hierbas debe dirigirse evitando el contacto de las gotas del líquido pulverizado con las hojas, los brotes tiernos, los retoños de la raíz y las heridas de poda no cicatrizadas. Sólo se permite la pulverización en los huertos y viñedos ya instalados,	False	El operario debe utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga, aplicación y limpieza del equipo, protección respiratoria de tipo FFP2 en aplicaciones manuales y aplicación con tractor del producto puro y ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas (tipo 3 o 4 hermética a productos líquidos) en aplicaciones manuales y con tractor del producto puro. La aplicación manual del producto sin diluir requiere la utilización de un equipo específico que permita acoplar directamente el envase de 1 l. a dicho equipo y el uso de guantes de protección química en el cambio de envase del equipo. No entrar a la zona tratada hasta que se haya secado la pulverización. Los envases superiores a 60 l. se utilizarán en condiciones de trasvase cerrado. SPO 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla. SEGURIDAD DEL APLICADOR El aplicador utilizará en la mezcla/carga: -Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN 374-1:2016/A1:2018 (los guantes pueden ser reutilizables o desechables). -Ropa de protección química tipo 6, frente a salpicaduras de líquidos conforme a norma UNE 13034:2005 +A1:2009. O Ropa de protección C1, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN 27065: 2017/A1:2019 -Ropa de protección parcial tipo delantal, tipo PB 3 o PB4, según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009 o parcial de nivel C3 según norma UNE EN 27065: 2017/A1:2019 -Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II). El aplicador utilizará en la aplicación: -Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN 374-1:2016/A1:2018 (los guantes pueden ser reutilizables o desechables). -Ropa de protección química tipo 6, frente a salpicaduras de líquidos conforme a norma UNE 13034:2005 +A1:2009.O Ropa de protección C1, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN 27065: 2017/A1:2019 -Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II). SEGURIDAD DEL TRABAJADOR El trabajador utilizará en la reentrada al cultivo: -Ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) o Ropa de protección C1, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN 27065: 2017/A1:2019.
ES-01138	RODEO PLUS	MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 36% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	Vigente			

25778	HERBITON	MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 36% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	Vigente	Volumen de caldo: 200-400 l/ha. Realizar una única aplicación por campaña cuando se emplee la dosis de 10 L producto/ha. Para cultivos leñosos, aplicar sólo en ejemplares no rastreros de más de 3-4 años, y en aplicación dirigida.	Seguridad del aplicador: Para todos los usos autorizados, en pulverización con tractor y manual, durante la mezcla/carga, se deberán utilizar guantes de protección química y durante la aplicación, mantenimiento y limpieza del equipo, se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN 14605: 2005 + A1: 2009), además de calzado adecuado. Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.
						Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar mediante equipos accionados por tractor en pulverización hidráulica (100-400 l/ha. de caldo - dosis máxima 10 l/ha.), centrífuga (20-50 l/ha. - dosis máxima, 6 l/ha.) o manuales con pulverización hidráulica 100 - 400 l/ha. de caldo, dosis máxima 10 l/ha.), centrífuga (20-50 l/ha. - dosis máx. 6 l/ha.). Equipos para aplicación de producto puro, dosis máx. 6 l/ha. Aplicadores manuales por contacto, dosis 2 l/ha. Para jardinería exterior doméstica mochila a dosis de 1,25 cc/m2 Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos. En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 l/ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 Kg. de s.a/ha.en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada.	Seguridad del trabajador: No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. La entrada de los trabajadores en las áreas tratadas durante las 24 horas siguientes a la aplicación debe realizarse utilizando camisas de manga larga, pantalones y botas. SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
						Controla malas hierbas en post-emergencia.	El operario debe utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga, aplicación y limpieza del equipo, protección respiratoria de tipo FFP2 en aplicaciones manuales y aplicación con tractor del producto puro y ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas (tipo 3 o 4 hermética a productos líquidos) en aplicaciones manuales y con tractor del producto puro. La aplicación manual del producto sin diluir requiere la utilización de un equipo específico que permita acoplar directamente el envase de 1 l. a dicho equipo y el uso de guantes de protección química en el cambio de envase del equipo. No entrar a la zona tratada hasta que se haya secado la pulverización. Los envases superiores a 60 l. se utilizarán en condiciones de trasvase cerrado. SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
16948	ROUNDUP ULTRA	MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 36% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	Vigente	Controla malas hierbas en post-emergencia.	El operario deberá utilizar guantes de protección adecuados durante la mezcla/carga y ropa de protección tipo 3 o 4 (hermética a productos líquidos) durante la aplicación hidráulica con equipos motorizados y manuales. Además, en las aplicaciones manuales se deberá utilizar mascarilla con filtro P2 o mascarilla autofiltante FFP2.
16252	SPASOR PLUS	MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 36% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	Vigente	Aplicar en pulverización variando la dosis según especies de malas hierbas y estado de desarrollo de las mismas siendo el momento más oportuno después de la floración, de las malas hierbas y atendiendo a las normas de seguridad, con equipos motorizados y pulverización hidráulica (100-400 l/ha de caldo - dosis máxima 10 l/ha) y atomizadores de disco rotatorio (20-50 l/ha de caldo - dosis máxima 6 l/ha) y con equipos de aplicación manual, con pulverización hidráulica la dosis máxima de 10 l/ha no se podrá diluir en un volumen de caldo inferior a 325 l y con pulverización centrífuga la dosis máxima de 3 l/ha no se podrá diluir en un volumen de caldo inferior a 25 l.	No entrar a la zona tratada hasta que el producto esté seco.
						Por motivos de seguridad no complementar la utilización del producto con escarda manual.	SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

				Controla malas hierbas anuales y vivaces en post-emergencia. Aplicación: Equipos accionados por tractor: pulverización hidráulica (100-400 l/Ha. de caldo); pulverización centrífuga (20-50 l/Ha. de caldo). Equipos manuales: pulverización hidráulica (200-400 l/Ha. de caldo). En la etiqueta deberá incluirse información sobre plantas tolerantes al herbicida que pueden inducir una inversión de flora (como malváceas). Por riesgo de fitotoxicidad, no mojar las partes verdes del cultivo. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 Kg.s.a./Ha., en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada. En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para el correcto uso del producto, así como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de su utilización por fitotoxicidad en variedades sensibles del propio cultivo, en los cultivos adyacentes o los siguientes en la alternativa; asimismo se informará sobre las especies de malas hierbas sensibles más comunes. En pulverización manual, el volumen será de 20-400 L/ha. En pulverización centrífuga, el volumen será de 20 L/ha. En Jardinería exterior doméstica, aplicar manualmente una dosis de 1,5-4,5 L/ha. No realizar tratamientos con dosis mayores de 3,75 L PF/ha en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada. En márgenes de cultivos y acequias, observar las precauciones indicadas para los correspondientes cultivos o plantaciones adyacentes. Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos. En plantaciones leñosas aplicar solo en cultivos de porte no rastrero, de más de 3-4 años, en aplicación dirigida. En praderas en aplicaciones puntuales para tratar malezas leñosas o en zonas localizadas para tratar malas hierbas cuando se pretenda la regeneración de las praderas o pastizales. En olivo de almazara para facilitar la recolección, se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 l/ha con un P.S. de 7 días. En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta utilización del producto, así como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de su utilización por		
22959	ROUNDUP*ENERG MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 45% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	Vigente	False	El aplicador deberá utilizar guantes de protección durante las operaciones de mezcla/carga y aplicación, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas. Además en las aplicaciones manuales deberán utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impermeables. La aplicación del producto sin diluir requiere la utilización de un equipo específico que permita acoplar directamente el envase de 1 l. a dicho equipo de aplicación con pantalla protectora y la utilización de guantes de protección para la aplicación y el cambio del envase. La aplicación con equipos manuales centrífugos también requiere la utilización de pantalla de protección. Durante las 48 horas posteriores al tratamiento, la entrada a la zona se realizará usando las mismas protecciones que durante la aplicación manual del producto. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. SPO 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla. En cítricos, frutales de cáscara, frutales de hueso y pepita, viñedo, olivar, plantaciones tropicales y subtropicales, plantaciones forestales (control malas hierbas en la plantación y cortafuegos), pastos y praderas (renovación o control selectivos de invasoras), canales de riego, márgenes de acequias y cultivos, maíz y algodón (entre líneas con campanas protectoras), en pulverización hidráulica y centrífuga con tractor, durante la mezcla/carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes de protección química. En áreas no cultivadas, barbechos, en pre-siembra y post-cosecha de cultivos herbáceos y horticolas, maíz Roundup Ready y remolacha Roundup Ready, en pulverización hidráulica con tractor, durante la mezcla/carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes de protección química. En cítricos, frutales de cáscara, frutales de hueso y pepita, viñedo, olivar, plantaciones tropicales y subtropicales, plantaciones forestales (control malas hierbas en la plantación y cortafuegos), pastos y praderas (renovación o control selectivos de invasoras), canales de riego, márgenes de acequias y cultivos, maíz y algodón (entre líneas con campanas protectoras), en pulverización hidráulica y centrífuga manual, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605: 2005 + A1:2009) y durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605: 2005 + A1:2009) además de botas impermeables. En maíz Roundup Ready y remolacha Roundup Ready, en pulverización centrífuga manual, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605: 2005 + A1:2009) y durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605: 2005 + A1:2009) además de botas impermeables. En plantaciones forestales (control de rebrotes de árboles cortados), en pulverización con equipos especiales para aplicación por impregnación (manual), durante la mezcla/carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes de protección química.
25441	ROUNDUP ULTIMA MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 48% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	Vigente	False	

ES-00787	GLIFOCHEM	BROKDEN S.L.	BROKDEN S.L.	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Vigente	Controla malas hierbas en postemergencia. “Adoptar prácticas alternativas de control de malezas (mecánicas, culturales, etc.) cuando sea posible, y alternancia de herbicidas (con herbicidas de diferente modo de acción) para evitar el desarrollo de resistencias”.	False	El aplicador deberá utilizar guantes de protección química, ropa de protección tipo 6 contra salpicaduras de productos líquidos y calzado resistente durante la mezcla/carga y aplicación. El trabajador deberá utilizar ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente durante la reentrada. Medidas adicionales de mitigación del riesgo: •Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. •En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga y aplicación. •Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación. •No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
23217	ACCELERATOR PRC FMC Agricultural Sc	CHEMINOVA(DINA)		GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Vigente	Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar en pulverización a baja presión. Por riesgo de fitotoxicidad, no mojar las partes verdes de los cultivos. En olivar para almazara, para facilitar la recolección, se puede efectuar un único tratamiento por campaña, en el ruedo del árbol, a dosis de 2,4 l/ha realmente tratada y un PS de 7 días. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 kg s.a./ha en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada. # PS: No permitir la entrada de ganado a las parcelas tratadas hasta transcurridos 10 días desde la fecha de aplicación.	False	El aplicador deberá utilizar guantes adecuados durante mezcla, carga y aplicación, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas. Además, en las aplicaciones manuales deberán utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impermeables. El retorno a la faena en las áreas o cultivos tratados, no debe realizarse durante las primeras 24 horas tras la aplicación del producto. En cualquier caso, se deberá usar ropa y guantes de protección adecuados al menos durante las 48 horas siguientes a la aplicación.
24505	GLYFOS TITAN	FMC Agricultural Sc	CHEMINOVA(DINA)	GLIFOSATO 68% (SAL AMÓNICA) [SG] P/P	Vigente	Controla malas hierbas en post-emergencia. En caso de que las infestantes sean gramíneas anuales en estado de post-emergencia precoz, son suficientes de 0,4-1 kg/ha. Aplicar en pulverización a baja presión. En la etiqueta se darán las advertencias relativas a los riesgos de utilización del producto. Evitar el contacto con cultivos adyacentes. No permitir la entrada de ganado a las parcelas tratadas hasta transcurridos 10 días desde la fecha de la aplicación. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 kg s.a./ha (2,6 kg producto/ha) en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada.	False	El operario deberá utilizar guantes de protección química durante la mezcla/carga y aplicación, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas. Además, en las aplicaciones manuales deberán utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impermeables. En áreas no cultivables señalizar la zona tratada durante al menos 48 horas. Durante las 48 horas posteriores al tratamiento, la entrada a la zona se realizará usando las mismas protecciones que durante la aplicación manual del producto. SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

22312	GLYFOS PROGRESS FMC Agrícola Sol	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Vigente	Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar mediante equipos accionados por tractor en pulverización hidráulica (100-250 l/Ha. de caldo - dosis máxima 10 l/Ha.) y pulverización centrífuga (20-30 l/Ha. de caldo - dosis máx 6 l/Ha.) o manuales con pulverización centrífuga (25 l/Ha. de caldo; dosis máxima 3 l/Ha. Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos. En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 l/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 Kg. de s.a./Ha.en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada.	False	El operario debe utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga, aplicación y limpieza del equipo, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas. Además, en las aplicaciones manuales deberán utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impermeables. En áreas no cultivables señalizar la zona tratada durante al menos 48 horas. No realizar actividades que impliquen el contacto con el área o el cultivo tratado hasta que el producto depositado esté seco y al menos 24 horas después de la aplicación. SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
23595	GLYFOS 45 AGROD FMC Agrícola Sol	GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Vigente	Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar en pulverización a baja presión. Por riesgo de fitotoxicidad, no mojar las partes verdes de los cultivos. En olivar para almazara, para facilitar la recolección, se puede efectuar un único tratamiento por campaña, en el ruedo del árbol, a dosis de 2,4 l/Ha. realmente tratada y un P.S de 7 días. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 Kg s.a./Ha. en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada.	False	El aplicador deberá utilizar guantes adecuados durante mezcla, carga y aplicación, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas. Además, en las aplicaciones manuales deberán utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impermeables. El retorno a la faena en las áreas o cultivos tratados, no debe realizarse durante las primeras 24 horas tras la aplicación del producto. En cualquier caso, se deberá usar ropa y guantes de protección adecuados al menos durante las 48 horas siguientes a la aplicación.
23594	WINNER COOP. PL FMC Agrícola Sol	GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Vigente	Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar en pulverización a baja presión. Por riesgo de fitotoxicidad, no mojar las partes verdes de los cultivos. En olivar para almazara, para facilitar la recolección, se puede efectuar un único tratamiento por campaña, en el ruedo del árbol, a dosis de 2,4 l/Ha. realmente tratada y un P.S de 7 días.	False	El aplicador deberá utilizar guantes adecuados durante mezcla, carga y aplicación, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas. Además, en las aplicaciones manuales deberán utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impermeables. El retorno a la faena en las áreas o cultivos tratados, no debe realizarse durante las primeras 24 horas tras la aplicación del producto. En cualquier caso, se deberá usar ropa y guantes de protección adecuados al menos durante las 48 horas siguientes a la aplicación.

						tratamiento herbicida en post-emergencia por pulverización mecánica y por pulverización manual (spot application) para eliminación de varetas en olivo. Aplicación en bandas como máximo a 1/3 de la superficie y aplicación dirigida a la base del tronco contra varetas en olivo. Para lograr una acción residual más prolongada, evitar arar un mes antes de la aplicación y dos semanas después. Usar material de aplicación o prácticas agrícolas que eviten el contacto de las partes comestibles con el principio activo o con el suelo tratado con el principio activo.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ES-00599	HILEO NT	KARYON	KARYON	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Vigente	tratamiento herbicida al aire libre por pulverización mecánica dirigida al suelo además de tratamiento localizado (por pulverización manual con lanza o mochila) en cultivos leñosos incluidos olivo, vid, cítricos, almendro y frutales.	
						En los cultivos leñosos incluidos los usos de olivo, vid, almendro y frutales, para las aplicaciones por pulverización normal entre filas, la dosis de aplicación real por unidad de superficie cultivada será de aprox. el 33% de la dosis nominal; y cuando el tratamiento sea localizado, para las aplicaciones alrededor de la base del tronco y entre filas, la dosis de aplicación real por unidad de superficie cultivada será de aprox. el 33-50% de la dosis nominal. En cítricos no aplicar el producto debajo de los árboles. Emplear prácticas agrícolas que eviten el contacto de los frutos con el producto o el suelo tratado. En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto. GESTIÓN DE LAS RESISTENCIAS -Aplicar las buenas prácticas de gestión integrada para el control de las malas hierbas. Usar herbicidas con diferentes mecanismos de acción y con tratamiento herbicida en post-emergencia por pulverización mecánica y por pulverización manual (spot application) para eliminación de varetas en olivo. Aplicación en bandas como máximo a 1/3 de la superficie y aplicación dirigida a la base del tronco contra varetas en olivo. Para lograr una acción residual más prolongada, evitar arar un mes antes de la aplicación y dos semanas después. Usar material de aplicación o prácticas agrícolas que eviten el contacto de las partes comestibles con el principio activo o con el suelo tratado con el principio activo. En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto así mismo se informará de la posibilidad de aparición de resistencias y se propondrá una estrategia de prevención y manejo de las mismas. GESTIÓN DE LAS RESISTENCIAS Deberán seguirse las siguientes recomendaciones: Adoptar prácticas alternativas de control de malas hierbas (mecánicas, culturales, etc.) cuando sea posible, y alternancia de herbicidas (de un modo de acción diferente) para evitar el desarrollo de	SEGURIDAD DEL APLICADOR El aplicador utilizará, tanto en la mezcla/carga como en la aplicación: guantes de protección química, ropa de protección tipo 6 (que protege frente a salpicaduras de productos líquidos) y calzado resistente. SEGURIDAD DEL TRABAJADOR El trabajador utilizará en la reentrada al cultivo y/o áreas tratadas: ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2)) y calzado resistente. Medidas adicionales de mitigación del riesgo: -Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. -En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga y aplicación. -Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación. -No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
ES-01145	COCTEL GOLD	LAINCO, S.A.	LAINCO, S.A.	GLIFOSATO (sal isopropilamina) 18% + MCPA 18% (sal isopropilamina) [SL] P/V	Vigente		SEGURIDAD DEL APLICADOR El aplicador utilizará, tanto en la mezcla/carga como en la aplicación: guantes de protección química, ropa de protección tipo 6 (que protege frente a salpicaduras de productos líquidos) y calzado resistente. SEGURIDAD DEL TRABAJADOR El trabajador utilizará en la reentrada al cultivo: ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2)) y calzado resistente. Medidas adicionales de mitigación del riesgo: -Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. -En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación. -No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. -Deberán emplearse bandas de seguridad de 10 m durante la aplicación. -No tratar más de 0,5 ha/día en aplicaciones para varetas en olivo. -Para tareas de duración superior a 2 horas, tras la aplicación del producto, se establece un plazo de reentrada de 14 días tras la primera y segunda aplicación por pulverización mecánica y 11 días tras la única aplicación manual en varetas de olivo (spot application).

21491	KARDA	LAINCO, S.A.	LAINCO, S.A.	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Vigente	Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar en pulverización hidráulica mediante tractor con un caldo de 200-500 l/Ha. con dosis máxima de 10 l/Ha. o mediante equipo manual con 300-500 l/Ha. de caldo y una dosis máxima de 8 l/Ha. de producto. Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos. En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 l/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 Kg. de s.a/Ha.en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada. Requiere de uso profesional en lugares no destinados al público en general, al aire libre de aplicación por pulverización. -No aplicar el tratamiento en condiciones climáticas adversas: viento, rocío, hielo. -No aplicar el tratamiento si hay posibilidades de lluvia en las 6 horas siguientes al tratamiento. -Evitar pulverizar y salpicar los cultivos adyacentes. -Por riesgo de fitotoxicidad, evitar mojar las partes verdes del cultivo. En el caso de los frutales de hueso, frutales de pepita, nogal, cítricos y olivo de verdeo se deberá utilizar material de aplicación o prácticas agrícolas que eviten el contacto de las frutas con el producto o con el suelo tratado con el producto. En la etiqueta se darán las instrucciones oportunas para el correcto uso del producto. Se recomienda que se implemente una estrategia para la prevención y manejo del riesgo de aparición de resistencias y que se incluya en la etiqueta del producto. Esta estrategia, deberá incluir un monitoreo del riesgo de aparición de resistencias.	False	El aplicador deberá utilizar guantes adecuados durante la mezcla/carga y aplicación, así como ropa de protección para el tronco y las piernas. Además, en las aplicaciones manuales deberán utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impermeables. No entrar en las áreas o cultivos tratados durante las primeras 24 horas tras la aplicación del producto. Durante las siguientes 24 horas se deberá usar ropa de protección y guantes de protección química adecuada. Los envases con capacidad superiores a 20 litros se deberán emplear en condiciones de trasvase cerrado mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón hasta el sistema de aplicación. SPO 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla. SEGURIDAD DEL APLICADOR El aplicador utilizará durante la mezcla/carga guantes de protección química, ropa de protección química C1 o tipo 6, delantal PB3 o PB4 o C3 y calzado resistente y durante la aplicación guantes de protección química, ropa de protección química C1 o tipo 6 y calzado resistente. SEGURIDAD DEL TRABAJADOR El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo ropa de trabajo adecuada o C1. NORMATIVA - Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN 374-1:2016. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables. - Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de líquidos conforme a norma UNE EN 13034:2005+A1:2009. - Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente. - Calzado resistente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II) conforme a la norma UNE EN 13832-2. - Ropa de protección C1/C3, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN 27065: 2017. - Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.
ES-01098	CLINIC TF	NUFARM ESPAÑA S	NUFARM ESPAÑA S.A	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Vigente	Además, se recomienda que se incluyan las		Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

ES-01147	GLISOMPA-PLUS	PROBELTE	PROBELTE	GLIFOSATO (sal isopropilamina) 18% + MCPA 18% (sal isopropilamina) [SL] P/V	Vigente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
----------	---------------	----------	----------	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

				Controla malas hierbas en postemergencia.		
				Aplicar en pulverización dirigida al suelo en una única aplicación por campaña, mediante tractor o manualmente con atomizadores rotativos con un volumen de caldo de 20 l/ha, pulverizadores hidráulicos a razón de 100-400 l/ha de caldo si se emplea tractor y 100-200 l/ha de caldo si se aplica de forma manual.		
				Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes del cultivo.		
				En las áreas no cultivadas se pueden efectuar hasta 3 aplicaciones contra malas hierbas anuales.		
				En jardinería exterior doméstica mezclar 75 ml de producto por litro de agua. Aplicar 1 l de caldo en 100 m2.		
				En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a razón de 3 l/ha realmente tratada y un plazo de seguridad de 14 días.		
				No realizar tratamientos con dosis superiores a 1,8 Kg s.a./ha en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada.	False	El aplicador deberá utilizar guantes durante la mezcla/carga y aplicación y cuando se prevea el contacto con superficies contaminadas, si se usa tractor y en las aplicaciones manuales deberá utilizar guantes durante la mezcla/carga y guantes y ropa de protección de tipo 3 o 4 (hermética a productos líquidos según UNE-EN 14605:2005+ A1:2009), en las aplicaciones hidráulicas y guantes, ropa de protección de tipo 3 o 4 y protección respiratoria (máscara o mascarilla autofiltrante con filtro de tipo FFP2 según UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006 (equipos de protección respiratoria, filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado) en las aplicaciones manuales con aplicador rotativo.
25428	TOUCHDOWN PRE SYNGENTA ESPAÑA SYNGENTA(SUIZA)	GLIFOSATO 36% (SAL AMÓNICA) [SL] P/V	Vigente			- Durante la limpieza del equipo de aplicación se utilizarán los mismos equipos de protección que durante la aplicación del producto. - No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. - Los envases de 120 l y 640 l se utilizarán en condiciones de trasvase cerrado (utilizando una bomba automática que vierta directamente del bidón al tanque de pulverización).
				Controla malas hierbas en postemergencia. No aplicar en superficies impermeables donde exista un alto riesgo de escorrentía. No aplicar durante lluvias fuertes. No aplicar en "Malas hierbas acuáticas" (incluida Thypha latifolia). Cuando sea posible, adopte prácticas alternativas de control de malas hierbas (mecánicas, culturales, etc.). Para evitar la acumulación de resistencias, alterne el uso de ORLADOR con herbicidas con diferentes modos de acción. No confíe en un modo de acción herbicida en el mismo campo durante años consecutivos.		
ES-00753	ORLADOR	TRADE CORPORATI TRADE CORPORATIOI P/V	Vigente	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL]	False	El aplicador deberá utilizar guantes de protección química, ropa de protección tipo 6 contra salpicaduras de productos líquidos, de acuerdo a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009 y calzado resistente. El trabajador deberá utilizar ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente. Medidas adicionales de mitigación del riesgo: · Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. · En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga. · Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo. · No entrar en las áreas tratadas hasta que se haya secado la pulverización.

						Tratamiento herbicida para uso profesional y no profesional.		
						Canales de riego, linderos, praderas naturales y praderas de siembra (uso profesional): En pulverización centrífuga (manual o tractor): 3 L/ha. Volumen: 25 L/ha. En pulverización con disco atomizador rotatorio (manual): 3 L/ha. Volumen: 30 L/ha. En pulverización normal (manual o tractor): 5-10 L/ha. Volumen: 100 L/ha. En pulverización disco atomizador rotatorio (tractor): 3-6 L/ha. Volumen: 20-30 L/ha. Uso no profesional: 50 ml/100 m2		
						Herbáceas extensivas e intensivas (uso profesional): En pulverización centrífuga (manual o tractor): 3 L/ha. Volumen: 25 L/ha. En pulverización con disco atomizador rotatorio (manual): 3 L/ha. Volumen: 30 L/ha. En pulverización normal (manual o tractor): 1,5-6 L/ha (adaptando el volumen de caldo para no superar el máximo de dosis por ha). En pulverización con disco atomizador rotatorio (tractor): 3-6/ha. Volumen: 20-30 L/ha. Uso no profesional: 15-60 ml/100 m2		
25449	GLYFOON	SINON EU	VICORQUIMIA, S.A.	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Vigente	Leñosas (uso profesional):	False	Seguridad del aplicador: Uso profesional: Mediante pulverización con disco atomizador rotatorio (tractor) y centrífuga (tractor), en canales de riego, linderos, praderas naturales y praderas de siembra, herbáceas extensivas e intensivas y leñosas, durante la mezcla/carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes de protección química. Mediante pulverización con disco atomizador rotatorio (manual) y centrífuga (manual), en canales de riego, linderos, praderas naturales y praderas de siembra, herbáceas extensivas e intensivas y leñosas, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química y en aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605: 2005 + a1:2009). Mediante pulverización normal con tractor y normal manual, en canales de riego, linderos, praderas naturales, praderas de siembra y leñosas y mediante pulverización normal manual en herbáceas extensivas e intensivas, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química, y durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605: 2005 + a1:2009) además de calzado adecuado. Mediante pulverización normal con tractor, en herbáceas extensivas e intensivas, durante la mezcla/carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes de protección química. Uso no profesional: En jardinería exterior domestica no son necesarias medidas de protección.
						Tratamiento herbicida al aire libre por pulverización foliar. Producto No indicado para usar en estructuras abiertas de protección (microtúneles, mallas antigranizo, mallas de sombreado y mantas térmicas). (* Ver Otras Indicaciones Reglamentarias)		
						En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.		
						GESTIÓN DE LAS RESISTENCIAS:		
						Se recomienda que se establezca una estrategia para la prevención y manejo de la resistencia, como el uso de productos fitosanitarios alternativos con otros modos de acción, utilizar prácticas agronómicas culturales como la rotación de cultivos y seguir la buena práctica agrícola propuesta.		
ES-01378	HALVETIC	ZAKLADY	ZAKLADY	GLIFOSATO 18% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Vigente			SEGURIDAD DEL TRABAJADOR El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: ropa de protección C1 o ropa de trabajo adecuada + calzado cerrado. NORMATIVA APLICABLE: - Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables. En el caso del trabajador deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente. - Ropa de protección química tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos conforme a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009. - Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2). - Calzado resistente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II). - Ropa de protección C1/C3, frente a productos fitosanitarios según norma UNE-EN ISO 27065:2017/A1:2019. - Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o

					herbicida sistémico de absorción foliar y radicular, de post-emergencia empleado contra malas hierbas gramíneas anuales y perennes y dicotiledóneas anuales y perennes. Método de aplicación: Pulverización normal con tractor. Aplicar mediante pulverización en bandas a proximidad del suelo, sin mojar las partes verdes del cultivo, desde el otoño hasta principios de la primavera, en cantidades que no superen los 150 g de sustancia activa por hectárea y año. Siguiendo las siguientes pautas: - Evitar siempre la deriva de la pulverización que puede provocar daños a cultivos adyacentes. - No labrar el terreno después de la aplicación, mientras se pretenda mantener el efecto de preemergencia de malas hierbas. - El suelo tiene que estar bien preparado, sin terrones ni restos vegetales. En caso de suelos con riesgo de formación de grietas, tratar después de su formación. - Si no llueve después de la aplicación y el suelo no está en tempero, dar un ligero riego para activar el herbicida. - No utilizar en terrenos que puedan encharcarse. - La pulverización tendrá que cubrir uniformemente la superficie del suelo con el objetivo de lograr una buena acción de preemergencia.		Seguridad del operador: En todos los usos autorizados se deberá usar guantes de protección química como mínima medida de protección individual en mezcla-carga, así como ropa de trabajo. En aplicación, será necesario el uso de ropa de trabajo. En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación, además de guantes de protección química. Seguridad del trabajador: En cítricos será necesario el uso de ropa de trabajo. Mientras tanto, en el olivo será necesario el uso de guantes de protección química y ropa de trabajo. Días de reentrada: 2 días para olivo y 3 días para cítricos. No entrar en el cultivo hasta que el producto esté seco. No tratar con este produto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química. Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado. Sólo autorizado como herbicida para pulverización hidráulica en bandas próxima al suelo, desde el otoño a principios de la primavera. (Reglamento de Ejecución (UE) No 798/2011 de la Comisión de 9 de agosto de 2011). El operario debe utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga y aplicación, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas. Además, en las aplicaciones manuales deberán utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impermeables. Señalizar la zona tratada durante al menos 48 horas. Durante las 48 horas posteriores al tratamiento, la entrada a la zona se realizará usando las mismas protecciones que durante la aplicación manual del producto. SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
24076	POLICE	ADAMA ESPAÑA	ADAMA ESPAÑA	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) + OXIFLUORFEN 3% [SC] P/V	Cancelado	False	
21541	ARBONAL	FMC Agricultural Sc	AGROCROS	GLIFOSATO 12% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Cancelado	False	

					Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar mediante equipos accionados por tractor en pulverización hidráulica (150-400 l/Ha. de caldo - dosis máxima 10 l/Ha.) o manuales con pulverización hidráulica (dosis máx. 10 l/Ha., no se podrá diluir en un volumen de caldo inferior a 325-400 l.) y con pulverización centrífuga (dosis máxima 3 l/Ha., no se podrá diluir en un volumen de caldo inferior a 25 l.). Para las aplicaciones manuales se recomienda la utilización de los volúmenes de caldo próximos al límite superior autorizado. Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos. En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 l/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 Kg. de s.a/Ha.en terrenos forestales (frondosas y coníferas) si existen setas silvestres en la zona tratada.		
24405	PITON VERDE	Albaugh (Eslovenia)	ALBAUGH EUROPE SA	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Cancelado	False	El aplicador deberá utilizar guantes adecuados durante la mezcla/carga y aplicación, así como ropa de protección para el tronco y las piernas. Además, en las aplicaciones manuales deberán utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impermeables. No entrar en las áreas o cultivos tratados durante las primeras 24 horas tras la aplicación del producto. Durante las siguientes 24 horas se deberá usar ropa de protección y guantes de protección química adecuada. SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
24427	VERDYS VERDE	Albaugh (Eslovenia)	ALBAUGH EUROPE SA	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Cancelado	False	El aplicador debe utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga y aplicación, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas. Además, en las aplicaciones manuales deberán utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impermeables. Durante las 48 horas posteriores al tratamiento, la entrada a la zona se realizará usando las mismas protecciones que durante la aplicación del producto. SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
21600	GLYFOCAL 36	ARYSTA S.A.S.	ARYSTA S.A.S.	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Cancelado	False	El operario debe utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga y aplicación, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas. En áreas no cultivables señalar la zona tratada durante al menos 48 horas. Durante las 48 horas posteriores al tratamiento, la entrada a la zona se realizará usando las mismas protecciones que durante la aplicación manual del producto. SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

						El aplicador utilizará guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009 durante la mezcla/carga y aplicación y el trabajador usará ropa de trabajo adecuada, es decir mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente para la reentrada.	
						Medidas adicionales de mitigación del riesgo:	
						•Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. •En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla y carga. •Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación. •No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. •El uso de los envases de capacidad superior a 20 L queda restringido al uso en condiciones de trasvase cerrado mediante la utilización de un sistema automático de bombeo.	
ES-00309	HERCAMPO ULTRA	ASCENZA	ASCENZA	GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Cancelado	Aplicación por pulverización con tractor, al voleo y dirigida al suelo. Se debe utilizar material de aplicación o prácticas agrícolas para evitar que las frutas entren en contacto con el principio activo o con el suelo tratado con sustancia activa.	
						Aplicar mediante técnicas especiales de pulverización a ultrabajo volumen, o diluido a bajo volumen con las máquinas de aplicación y boquillas especiales indicadas en la etiqueta. Malas hierbas en postemergencia. Las dosis inferiores a 3 l/ha. solo son eficaces contra gramíneas en postemergencia temprana. Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos. Para evitar pérdidas de eficacia no pastar las parcelas tratadas hasta pasados 7 días, en el caso de malas hierbas perennes, o 1 día para anuales.	
22170	GLIFOPEC	Sin Asignar	ASCENZA (P)	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Cancelado	False	
						Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar mediante equipos accionados por tractor en pulverización hidráulica (100-300 l/Ha. de caldo - dosis máxima 10 l/Ha.) y atomizadores de disco rotatorio (mínimo 20 l/Ha. de caldo - dosis máx 6 l/Ha.) o manuales con pulverización hidráulica (dosis máx. 10 l/Ha., no se podrá diluir en un volumen de caldo inferior a 325 l.) y con pulverización centrífuga (dosis máxima 3 l/Ha., no se podrá diluir en un volumen de caldo inferior a 25 l.) Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos. En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 l/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 Kg. de s.a/Ha.en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada. En la etiqueta se darán las instrucciones para el correcto uso del producto.	
25546	BARBARIAN	BARCLAY LTD	BARCLAY LTD	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Cancelado	False	SPO 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

25728	BARBARIAN SUPEF	BARCLAY LTD	BARCLAY LTD	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Cancelado	Controla malas hierbas en postemergencia. Una sólo aplicación. Pulverizar diluido en agua a baja presión o mediante la utilización de máquinas especiales de ULV de gota controlada. Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 Kg. de s.a/Ha. en coníferas y frondosas (terrenos forestales) si existen setas silvestres en la zona tratada.	False	El aplicador deberá utilizar guantes de protección química en la mezcla/carga, aplicación mantenimiento y limpieza del equipo y ropa de protección química y calzado adecuado durante la aplicación (si el tractor carece de cabina cerrada) y limpieza del equipo. Evítese el contacto con el follaje húmedo. SPO 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
25729	BARBARIAN XTRA	BARCLAY LTD	BARCLAY LTD	GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Cancelado	Controla malas hierbas en post-emergencia. Aplicar mediante equipos de pulverización a baja presión (máx. 2 atm), con barra o lanza con boquillas de abanico o espejo, en un volumen de caldo de 100-300 l/ha, procurando mojar uniformemente las hierbas. Utilizar las dosis más bajas cuando las infestantes sean gramíneas anuales en estado de crecimiento precoz. En los cultivos en los que debe evitarse todo contacto con este herbicida, la aplicación solo podrá realizarse de forma selectiva. En olivo de almazara para facilitar la recolección, se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 2,7 l/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días. En la etiqueta se darán las advertencias relativas a los riesgos de utilización del producto, así como las indicaciones oportunas para su correcta aplicación, con expresión detallada de la dosis en función de las especies de malas hierbas a controlar y su estado de desarrollo.	False	El aplicador deberá utilizar guantes de protección química en la mezcla/carga, aplicación mantenimiento y limpieza del equipo y ropa de protección química y calzado adecuado durante la aplicación (si el tractor carece de cabina cerrada) y limpieza del equipo. Evítese el contacto con el follaje húmedo. SPO 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla. Los envases mayores de 20 l. se utilizarán mediante trasvase cerrado de bombeo cerrado.
25791	ROUNDUP 48H	MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 0,72% (SAL ISOPROPILAMINA) [AL] P/V	Cancelado	Aplicación en pulverización. Máximo de una aplicación al año. Para el control de malas hierbas anuales (dosis de 25 ml/m2) y de vivaces o perennes (dosis de 35 ml/m2).	False	
25687	ROUNDUP GEL	MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 0,72% (SAL ISOPROPILAMINA) [AL] P/V	Cancelado	Listo al uso (aplicación directa desde el envase por medio de un gatillo). Realizar un máximo de 3 aplicaciones anuales.	False	Se recomienda el uso de guantes de protección química durante la utilización del producto. No entrar en contacto con las zonas tratadas hasta que el producto esté seco.

18177	STING SE	MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 12% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Cancelado	Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar diluido en agua, en pulverización a baja presión. Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos. En la etiqueta se darán las advertencias necesarias para la utilización correcta del producto. En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 9 l/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 Kg. de s.a/Ha.en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada.	False	El operario debe utilizar guantes de protección adecuados durante la mezcla-carga y aplicación, así co
24201	SUPER STING	MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 24% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	Cancelado	Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar mediante pulverización hidráulica a baja presión o pulverización centrífuga. Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos. En la etiqueta se darán las advertencias necesarias para la utilización correcta del producto. En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 4,5 l/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días.	False	El aplicador deberá utilizar guantes adecuados durante la mezcla/carga y aplicación, así como ropa de protección adecuada (impermeable) para el tronco y las piernas. Los equipos accionados por el tractor: pulverización hidráulica (100-400 l/ha de caldo - dosis máxima 8 l/ha) y atomizadores de disco rotatorio (20-50 l/ha de caldo - dosis máxima 6 l/ha). Equipos manuales: pulverización hidráulica (200-400 l/ha de caldo - dosis máxima 8 l/ha) y pulverización centrífuga UBV (a la dosis máxima de 6 l/ha, no se podrá diluir en un caldo inferior a 35 l/ha). Aplicación manual del producto sin diluir, dosis máxima de 8 l/ha. Para los bidones y contenedores en condiciones de trasvase cerrado (utilizar bomba automática que vierta el producto directamente del bidón al tanque de aplicación). La aplicación del producto sin diluir requiere la utilización del sistema de aplicación "PURO system" de Monsanto, con o sin pantalla de protección, la utilización únicamente del envase de 1 litro fijable al equipo de aplicación y la utilización de guantes de protección para la aplicación y el cambio de envase. En caso de ser necesaria la entrada en las áreas tratadas en un plazo inferior a 48 horas tras la aplicación, se deberá utilizar la misma ropa de protección que para la aplicación del producto. SPO 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
18099	SPASOR PLUS N	MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Cancelado	Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar en pulverización variando la dosis según especies de malas hierbas y estado de desarrollo de las mismas siendo el momento más oportuno después de la floración, de las malas hierbas y atendiendo a las normas de seguridad, con equipos motorizados y pulverización hidráulica (100-400 l/Ha. de caldo - dosis máxima 10 l/Ha.) y atomizadores de disco rotatorio (20-50 l/Ha. de caldo - dosis máxima 6 l/Ha.) y con equipos de aplicación manual, con pulverización hidráulica la dosis máxima de 10 l/Ha. no se podrá diluir en un volumen de caldo inferior a 325 l. y con pulverización centrífuga la dosis máxima de 3 l/Ha. no se podrá diluir en un volumen de caldo inferior a 25 l.	False	El operario deberá utilizar guantes de protección adecuados durante la mezcla-carga y la aplicación así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas. Además, en las aplicaciones manuales se deberá utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impermeables. SPO 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

ES-00051	ROUNDUP 36KZ	MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 36% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	Cancelado	Controla malas hierbas en post-emergencia. Aplicar en pulverización mecánica o manual, dirigida al suelo a baja presión. Se recomienda el uso de boquillas de baja deriva para las pulverizaciones hidráulicas (100-400 l/ha). Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos, evitar el contacto con las hojas, heridas de poda y troncos jóvenes (< 4 años). Aplicación de prácticas agrícolas que eviten el contacto de los frutos con el producto o el suelo tratado. Principalmente en olivar donde no podrá recogerse aceituna de suelo. Para prevenir o retrasar el desarrollo de resistencia de malas hierbas, alterne la aplicación de este herbicida con la de herbicidas con diferentes modos de acción y adopte prácticas agronómicas adecuadas de control de malas hierbas, como la rotación de cultivos, la técnica de falsa siembra, métodos de control mecánicos, etc. Deben realizarse evaluaciones regulares con el fin de monitorizar a largo plazo cualquier posible evolución de la sensibilidad de las malas hierbas al producto. Emplear prácticas agrícolas que eviten el contacto de los frutos con el producto o el suelo tratado. No aplicar para deshidratación de alfalfa o para alfalfa destinada a forraje. La dosis acumulada anual no debe exceder 3.6 kg sa /ha.	El aplicador utilizará guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009 durante la mezcla/carga y aplicación y ropa de trabajo adecuada, es decir mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente para la reentrada. Medidas adicionales de mitigación del riesgo: •Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. •En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla y carga. •Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación. •No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. •El uso de los envases de capacidad superior a 20 L queda restringido al uso en condiciones de trasvase cerrado mediante la utilización de un sistema automático de bombeo.
ES-00052	SPASOR KZ	MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 36% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	Cancelado	Controla malas hierbas en post-emergencia. Aplicar en pulverización mecánica o manual, dirigida al suelo a baja presión. Se recomienda el uso de boquillas de baja deriva para las pulverizaciones hidráulicas (100-400 l/ha). Para prevenir o retrasar el desarrollo de resistencia de malas hierbas, alterne la aplicación de este herbicida con la de herbicidas con diferentes modos de acción. Deben realizarse evaluaciones regulares con el fin de monitorizar a largo plazo cualquier posible evolución de la sensibilidad de las malas hierbas al producto.	El aplicador utilizará guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009 durante la mezcla/carga y aplicación y ropa de trabajo adecuada, es decir mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente para la reentrada. Medidas adicionales de mitigación del riesgo: •Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. •En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla y carga. •Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación. •No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. •El uso de los envases de capacidad superior a 20 L queda restringido al uso en condiciones de trasvase cerrado mediante la utilización de un sistema automático de bombeo.

						Realizar 1 sola aplicación de Spasor Pro por campaña a baja presión (menos de 2 kg/cm2) de forma homogénea sobre el follaje de las malas hierbas en crecimiento activo, sin que la pulverización llegue a cultivos vecinos o plantas no objetivo. La aplicación se realizará previa dilución en volúmenes de caldo de 200 l/ha (tratamiento contra malas hierbas), 300 l/ha (pulverización con lanza o mochila para eliminación de especies arbustivas) o 1 l/m2 (desvitalización de tocones mediante pulverización manual o pintado de tocones), en días sin viento, preferiblemente con boquillas anti-deriva. El método de aplicación será pulverización con tractor para tratamientos contra malas hierbas, pulverización con mochila o con lanza para desvitalización y eliminación de especies arbustivas; y pulverización manual o pintado de tocones para la desvitalización de tocones. En parques, jardines, aceras y desbroce total: Si se trata de zona permeable el máximo de dosis será de 6 l/ha/año y si se trata de zona impermeable 3,25 l/ha/año.		
25815	SPASOR PRO	MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 48% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	Cancelado		False	Seguridad del aplicador: En las operaciones de mezcla/carga se deberá emplear guantes de protección química y ropa de trabajo. En aplicaciones mediante pulverización con tractor será necesario emplear ropa de trabajo. En aplicaciones mediante pulverización con mochila será necesario emplear guantes de protección química y ropa de trabajo. En aplicaciones mediante pulverización con lanza será necesario emplear guantes de protección química y ropa de protección química o mono tipo 3 ó 4: Basándose en el porcentaje de penetración en cuerpo del 5 %, se corresponde con un equipo de tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605:2005+A1:2009. Para pintado de tocones se deberá emplear guantes de protección química y ropa de protección química o mono tipo 3 ó 4: Basándose en el porcentaje de penetración en cuerpo del 5 %, se corresponde con un equipo de tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605:2005+A1:2009.
						Aplicar en pulverización a baja presión diluido en agua o mediante la utilización de máquinas especiales de ultra bajo volumen (ULV) de gota controlada. Por riesgo de fitotoxicidad, no mojar las partes verdes de los cultivos. En olivar para almazara, para facilitar la recolección, se puede efectuar un único tratamiento por campaña, en el ruedo del árbol, a dosis de 2 l/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 Kg s.a./Ha. en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada.		
24231	ROUNDUP POWER MONSANTO (ESP)	BAYER BV		GLIFOSATO 54% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V	Cancelado		False	El operario debe utilizar guantes de protección química durante la mezcla/carga y aplicación, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas. Además, en las aplicaciones manuales deberán utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impermeables. La aplicación del producto sin diluir requiere la utilización de un equipo específico que permita acoplar directamente el envase de 1 l. a dicho equipo dotado de pantalla de protección y la utilización de guantes de protección para la aplicación y el cambio de envase del equipo. La aplicación con equipos manuales centrífugos también requiere la utilización de pantalla de protección. Con aplicadores centrífugos con tractor, por razones de seguridad utilizar sólo los envases de 5 y 20 l. El manejo del producto en envases de 640 y 1000 l. se hará en condiciones de trasvase cerrado, utilizando una bomba automática que vierta directamente al tanque de aplicación. Durante las 48 horas posteriores al tratamiento, la entrada a la zona se realizará usando las mismas protecciones que durante la aplicación. SPO 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

ES-00273	ROUNDUP REVOLL MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 72% [SG] P/P	Cancelado	Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar en pulverización mecánica o manual, dirigida al suelo a baja presión. Se recomienda el uso de boquillas de baja deriva para las pulverizaciones hidráulicas (100-400 l/ha). Aplicación de prácticas agrícolas que eviten el contacto de los frutos con el producto o el suelo tratado. Principalmente en olivar donde no podrá recogerse aceituna de suelo. Para prevenir o retrasar el desarrollo de resistencia de malas hierbas, alterne la aplicación de este herbicida con la de herbicidas con diferentes modos de acción y adopte prácticas agronómicas adecuadas de control de malas hierbas, como la rotación de cultivos, la técnica de falsa siembra, métodos de control mecánicos, etc. Deben realizarse evaluaciones regulares con el fin de monitorizar a largo plazo cualquier posible evolución de la sensibilidad de las malas hierbas al producto. Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos.	El aplicador utilizará guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009 durante la mezcla/carga y aplicación y ropa de trabajo adecuada, es decir mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente para la reentrada.	
					Medidas adicionales de mitigación: - En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación. - Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. - No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.		
ES-00281	SPASOR MAX	MONSANTO (ESP)	BAYER BV	GLIFOSATO 72% [SG] P/P	Cancelado	Controla malas hierbas en post-emergencia. Aplicar en pulverización mecánica o manual, dirigida al suelo a baja presión. Se recomienda el uso de boquillas de baja deriva para las pulverizaciones hidráulicas (100-400 l/ha). Para prevenir o retrasar el desarrollo de resistencia de malas hierbas, alterne la aplicación de este herbicida con la de herbicidas con diferentes modos de acción y adopte prácticas de gestión integrada de malas hierbas en áreas no cultivadas. Deben realizarse evaluaciones regulares con el fin de monitorizar a largo plazo cualquier posible evolución de la sensibilidad de las malas hierbas al producto. La dosis máxima anual de sustancia activa es de 3.6 kg sa/ha.	El aplicador utilizará guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 (protege contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009) durante la mezcla/carga y aplicación y, ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente) para la reentrada.
						Medidas adicionales de mitigación: - En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación. - Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. - Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación. - No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.	
25639	KOMANDO RTU	EVERGREEN GARD	EVERGREEN GARDEN	P/V	Cancelado	Controla malas hierbas en postemergencia. Dosis:25 ml/m2 contra malas hierbas anuales y bianuales; 35 ml/m2 contra malas hierbas vivaces. Aplicar en pulverización únicamente sobre las malas hierbas presentes, evitando el goteo. Tratar de marzo a noviembre. No realizar más de un tratamiento en toda la superficie, ni más de 3 localizados, al año. Los plazos de seguridad son: 30 días en cultivos hortícolas, 21 días en frutales, 7 en olivo y 90 en kiwi.	Utilizar guantes adecuados durante la aplicación del producto. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

21540	GLYFOSTINE	FMC Agricultural Sc	FMC Agricultural Sol	GLIFOSATO 12% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Cancelado	Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar mediante equipos accionados por tractor en pulverización hidráulica (100 l/Ha. de caldo - dosis máxima 20 l/Ha.) o manuales con pulverización hidráulica (250 l/Ha. de caldo - dosis máx. 20 l/Ha.). Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos. En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 9 l/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 Kg. de s.a/Ha.en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada.	False	El operario debe utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga y aplicación, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas. Además, en las aplicaciones manuales deberán utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impermeables. En áreas no cultivables señalizar la zona tratada durante al menos 48 horas. Durante las 48 horas posteriores al tratamiento, la entrada a la zona se realizará usando las mismas protecciones que durante la aplicación manual del producto. Spo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
24396	HALCON	FMC Agricultural Sc	FMC Agricultural Sol	GLIFOSATO 26% (SAL ISOPROPILAMINA) + PIRAFUFEN-ETIL 0,17% [SC] P/V	Cancelado	Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar en pulverización a baja presión evitando mojar las partes verdes del cultivo, efectuando un máximo de 2 aplicaciones al año En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 4 l/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días.	False	El aplicador deberá utilizar guantes de protección química adecuados durante la operación de mezcla/carga, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas. Además en las aplicaciones manuales deberán utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impermeables. En áreas sin cultivo señalizar la zona tratada durante al menos 48 horas. Durante las 48 horas posteriores al tratamiento, la entrada a la zona se realizará usando las mismas protecciones que durante la aplicación manual del producto. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. SPO 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla. Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. El aplicador deberá utilizar guantes de protección durante la mezcla/carga y en la aplicación con tractor en cultivos bajos. El aplicador deberá utilizar guantes de portección durante la mezcla/carga y aplicación y ropa de protección tipo 6 (contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+a1:2009) en las aplicaciones manuales de cultivos bajos. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación. El uso de los envases de más de 20 L queda restringido al uso en condiciones de transvase cerrado
ES-00091	HELOSATE PLUS	HELM AG	HELM AG	GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Cancelado	Aplicar en pulverización con tractor, amplio espectro, pulveriza	mediante la utilización de un sistema automático de bombeo.	

22992	LASER PLUS	IND_AFRASA	IND_AFRASA	Herbicida sistémico de absorción foliar y radicular, empleado en post-emergencia de malas hierbas gramíneas anuales y perennes y dicotiledóneas anuales y perennes. Método de aplicación: Pulverización normal con tractor. Aplicar mediante pulverización en bandas a proximidad del suelo, como a un tercio de la superficie, sin mojar las partes verdes del cultivo, desde el otoño hasta principios de primavera, en cantidades que no superen los 150 g de sustancia activa por hectárea y año. Aplicar el producto de acuerdo a las indicaciones que figuran en la etiqueta. Evitar el uso repetido del mismo herbicida o el uso de herbicidas con el mismo modo de acción. Utilizar prácticas alternativas de manejo de malezas como cultivos competitivos, la labranza, labranza secundaria (azada rotativa, el cultivo), plantación tardía, pastoreo, etc. Evitar la propagación de malas hierbas resistentes. Informar a la empresa de la posible aparición de resistencias.	Cancelado	False	Aplicador: En mezcla/carga el aplicador deberá llevar guantes de protección química, ropa de trabajo (manga larga y pantalón largo) y calzado adecuado. En la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo deberá llevar ropa de trabajo (manga larga y pantalón largo) y calzado adecuado. Trabajador: En la re-entrada a la parcela, el trabajador deberá llevar guantes de protección química, ropa de trabajo (manga larga y pantalón largo) y calzado adecuado. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química. SPO 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla. Sólo autorizado como herbicida para pulverización hidráulica en bandas próxima al suelo, desde el otoño a principios de la primavera. (Reglamento de Ejecución (UE) No 798/2011 de la Comisión de 9 de agosto de 2011).
22992	LASER PLUS	IND_AFRASA	IND_AFRASA	GLIFOSATO 20% (SAL ISOPROPILAMINA) + OXIFLUORFEN 3% [SC] P/V	Cancelado	False	Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar, añadiendo al caldo sulfato amónico al 1%, mediante tractor en pulverización hidráulica 100-400 l/Ha de caldo, dosis máx. de 8 l/Ha.), centrífuga (consumo mínimo de 50 l/Ha. de caldo y dosis máx. de 8 l/Ha.) y en aplicación manual, pulverización hidráulica (200-400 l/Ha. de caldo, dosis máx. 8 l/Ha.) o centrífuga (20-50 l/Ha, de caldo y dosis máx de 8 l/Ha.). En olivo de almazara para facilitar la recolección, se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 2,7 l/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días. En la etiqueta se darán las advertencias relativas a los riesgos de utilización del producto, así como las indicaciones oportunas para su correcta aplicación, con expresión detallada de la dosis en función de las especies de malas hierbas a controlar y su estado de desarrollo. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 l. de s.a/Ha. en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada.
18176	ROUNDUP 400 PRIMONSANTO (ESP)	MONSANTO (ESP)	MONSANTO (ESP)	GLIFOSATO 40% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Cancelado	False	El aplicador deberá utilizar guantes de protección química y pantalla facial durante la mezcla/carga, así como protección respiratoria tipo FFP3 en aplicaciones manuales y ropa de protección química [tipo 6 en aplicaciones con tractor y tipo 3 o 4 (hermética a productos líquidos) en aplicaciones manuales] para el tronco y las piernas durante la aplicación y limpieza del equipo. Los envases de 60 l. y mayores se utilizarán en condiciones de trasvase cerrado. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. Por motivos de seguridad, no complementar, la aplicación con escarda manual. SPO 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

25738	CREDIT 540	NUFARM ESPAÑA S	NUFARM ESPAÑA S.A	GLIFOSATO 54% (SAL ISOPROPILAMINA Y SAL AMÓNICA) [SL] P/V	Cancelado	False	Seguridad del operador: En todos los usos autorizados, durante la mezcla/carga se deberá utilizar guantes de protección química. En forestales, en pulverización manual y durante la aplicación, limpieza y mantenimiento se deberá utilizar guantes de protección, ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605: 2005 + A1: 2009) y calzado adecuado. En frutales (excepto frutales de hueso, kiwi y plátano) y vid, a la dosis más baja, y en pulverización manual, durante la aplicación, limpieza y mantenimiento se deberá utilizar guantes de protección química. Mientras tanto, a la dosis más alta, será necesario el uso de guantes y ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605: 2005 + A1: 2009), y calzado adecuado. En cultivos extensivos, leguminosas, cultivos industriales, trigo y cebada (no utilizar en la obtención de semilla, trigo de panificación, ni cebada para producción de malta y cerveza), en pulverización normal con tractor, durante la aplicación, limpieza y mantenimiento, se deberán utilizar guantes de protección química. Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.
				Pulverización normal con tractor en cultivos extensivos, leguminosas, cultivos industriales y cereales (trigo y cebada). En forestales, frutales y vid, la pulverización será manual. En todos los usos para un volumen de caldo de 100-300 l/ha, pero en aplicación manual (mochila y lanza) se deberá utilizar un volumen mínimo de 200 l/ha. Controla malas hierbas en postemergencia. Aplicar en pulverización hidráulica con equipos accionados por tractor y manuales (300 l/Ha. de caldo con dosis máx. de 10 Kg /Ha.) Evitar mojar las partes verdes del cultivo para evitar fitotoxicidades. En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 kg/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 Kg. de s.a/Ha.en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada.			Seguridad del trabajador: No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. En caso de manipulación del sistema de riego en las 48 horas posteriores al tratamiento, se utilizarán botas (de caucho o poliméricas), ropa y guantes de protección química adecuados. SPO 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
19871	BUGGY 360 SG	SIPCAM INAGRA	SIPCAM	GLIFOSATO 36% (SAL AMÓNICA) [SG] P/P	Cancelado	False	El aplicador deberá utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga, aplicación y limpieza del equipo. Durante la aplicación con tractor se utilizará ropa de protección química para el tronco y las piernas tipo 6 (salpicaduras de productos líquidos). Durante la aplicación manual se utilizará ropa de protección química para el tronco y las piernas tipo 4 (hermética a productos líquidos). Se utilizará pantalla facial que proteja frente a salpicaduras durante la mezcla/carga del producto. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. No entrar en las áreas o cultivos tratados durante las primeras 24 h. tras la aplicación del producto. Durante las siguientes 24 h. se deberá usar ropa de protección y guantes de protección química adecuada. SPO 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

						SEGURIDAD DEL APLICADOR
						•MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO: oRopa de trabajo. oGuantes de protección química. •APLICACIÓN: Mediante tractor: oRopa de trabajo. Mediante lanza/pistola y mochila: oRopa de trabajo oGuantes de protección química.
19418	BUGGY BAX	SIPCAM INAGRA	SIPCAM INAGRA	GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V	Cancelado	Tratamiento herbicida sistémico de absorción foliar. Modo y momento de aplicación: Una sola aplicación mediante pulverización con tractor o pulverización manual con lanza y/o mochila. Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 kg de s.a./ha en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada. False
22957	TOUCHDOWN SPE	SYNGENTA ESPAÑA	SYNGENTA (GRAN	GLIFOSATO 36% (SAL AMÓNICA) [SL] P/V	Cancelado	Controla malas hierbas anuales o vivaces en postemergencia Aplicar en pulverización a baja presión, evitando el contacto con las hojas y partes verdes de los cultivos.. Tratar fuera de las horas de calor con una humedad relativa alta. No tratar en período de heladas ni con viento. En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 l/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días. False El aplicador deberá utilizar guantes de protección química durante la mezcla/carga, manejo, limpieza del equipo y aplicación. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
24528	TERMINO PLUS	SYNGENTA ESPAÑA	SYNGENTA ESPAÑA	GLIFOSATO 36% (SAL AMÓNICA) [SL] P/V	Cancelado	Controla malas hierbas anuales o vivaces en postemergencia Aplicar en pulverización a baja presión, evitando el contacto con las hojas y partes verdes de los cultivos.. Tratar fuera de las horas de calor con una humedad relativa alta. No tratar en período de heladas ni con viento. En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 l/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días. False

ES-00310	BALCONY	TRADE CORPORATI	TRADE CORPORATIO	GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL]	Aplicación por pulverización con tractor, al voleo y dirigida al suelo. Se debe utilizar material de aplicación o prácticas agrícolas para evitar que las frutas entren en contacto con el principio activo o con el suelo tratado con sustancia activa	El aplicador utilizará guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009 durante la mezcla/carga y aplicación y el trabajador usará ropa de trabajo adecuada, es decir mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente para la reentrada. Medidas adicionales de mitigación del riesgo: •Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. •En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla y carga. •Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación. •No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. •El uso de los envases de capacidad superior a 20 L queda restringido al uso en condiciones de trasvase cerrado mediante la utilización de un sistema automático de bombeo.
					Cancelado	